

FICHA TÉCNICA



Fecha de elaboración:	11.06.15	Fecha de actualización:	11.10.2018
Elaboró	GDIEI	Revisó	GDIEI
Identificación de la empresa:	Bayer de México S.A. de C.V. Unidad de Negocio Environmental Science Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 259 Col. Granada C.P. 11520 Ciudad de México		
Teléfonos de emergencia:	Bayer de México: (55) 5713 7011 Seguridad Industrial, Planta Santa Clara: (55) 5699 14 82 SINTOX: (55) 5598 6659 Lada sin costo: 01 800 009 2800		
MAXFORCE®			
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”		% en peso	
Ingrediente activo:		2.15	
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina (Equivalente a 21.5g de i.a./Kg)			
Ingredientes inertes:		97.85	
Cebo, amortiguadores, espesantes, emulsificantes, anticongelante, conservadores, dispersante, amargante, antiespumante, solventes, humectante.			
TOTAL		100.00	
RSCO-INAC-0199-0482-382-2.15			
Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V. Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540 Tel.: 01 (55) 5713 2001 “HECHO EN FRANCIA” © Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5		Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Granada. C.P. 11520, Ciudad de México Lada sin costo 01-800-229-37-27 servicioalcliente.crop@bayer.com www.environmentalscience.bayer.mx	
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”			
MAXFORCE® deberá utilizar guantes protectores			
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD			
En caso de exposición crónica al producto o ingestión de grandes cantidades, pueden presentarse síntomas tales como fatiga, debilidad muscular, disturbios respiratorios y hasta calambres musculares. En caso de contacto con los ojos y/o la piel se puede presentar ligera irritación en personas sensibles.			
“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”, “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS”. “NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”, “EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.			
Guardar y transportar MAXFORCE® en su empaque original debidamente cerrado.			
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.			
“PRIMEROS AUXILIOS”			
MAXFORCE® es del grupo químico de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. Tratamiento: sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado, así como laxantes salinos. Antídoto: no existe antídoto específico.			
“ALEJE A LA PERSONA DEL AREA” “EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA”. “EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.			

FICHA TÉCNICA



FORMA ADECUADA DE USO


MAXFORCE® es un cebo específico para eliminar cucarachas en todos aquellos lugares donde se observa su actividad y por donde circulan y pasan las cucarachas. Posee amplio margen de seguridad para su familia y animales domésticos.

Nunca aplique otros insecticidas sobre el producto. El efecto de **MAXFORCE®** puede durar hasta 12 semanas, siempre y cuando se encuentre presente el cebo. Se deberán renovar los puntos de aplicación tanto como sea necesario hasta que desaparezca la infestación. Recuerde que **MAXFORCE®** tiene que ser consumido por las cucarachas. También se puede utilizar como tratamiento preventivo en áreas libres de cucarachas para evitar posibles infestaciones.

MODO DE EMPLEO

- Inspeccione y limpie el área a tratar, para eliminar los factores que favorecen la presencia de cucarachas: basura y alimento principalmente.
- Presione la tapa de la jeringa hacia abajo y jale de ella, posteriormente aplique el producto presionando suavemente el émbolo de la jeringa. Al finalizar la aplicación, vuelva a colocar la tapa.

Aplique una gota de producto por cada metro a lo largo del recorrido de las cucarachas o una gota por m² del área a tratar. Ejemplo: en una cocina de 10 m², aplicar 10 gotas de producto distribuidas en lugares estratégicos de la cocina, como pueden ser: grietas y esquinas de paredes, marcos de ventanas, rincones; cerca de grietas y hendiduras; debajo de muebles, tarjas y botes de basura; detrás de cajones; en los espacios huecos de cocinas integrales y/o modulares.



La mayor actividad del producto se logra cuando la aplicación se realiza a lo largo del trayecto de las cucarachas. En caso de una gran infestación, se deberá aplicar un mayor número de gotas, logrando así una mayor disposición del producto para las cucarachas.

©Marca Registrada por Bayer Group